

PRIMPERAN

Composición: Clorhidrato de Metoclopramida anhidra.

Vía de administración: Oral e I.M-I.V.

Clase Terapéutica: Antiemético.

Indicaciones: Antiemético. Náuseas, vómitos, trastornos digestivos de tipo dispéptico. Preparación para determinados exámenes del tubo digestivo.

Posología:

- **Comprimidos:** Dosis: **Adulto:** 10 – 15 mg tres veces al día.
- **Ampollas:** Dosis: **Niños:** 0,5 mg/Kg/día divididos en tres dosis. **Adulto:** 10 – 15 mg tres veces al día.
- **Solución Bebible:** **Niños:** 0,5 mg/Kg/día divididos en tres dosis. **Adulto:** 10 – 15 mg tres veces al día.
- **Gotas:** Esta forma farmacéutica está reservada a los lactantes. **Posología habitual:** 4 gotas/Kg/día, distribuidas durante el día. En todos los casos. Limitarse estrictamente a la prescripción del médico. No volver a utilizar sin consejo médico. *Vía oral:* se debe utilizar únicamente el cuentagotas suministrado o, en su defecto, un cuentagotas adquirido en la farmacia.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la metoclopramida. Epilepsia, pacientes con trastornos disquinéticos, pacientes que reciben medicamentos que causen trastornos extrapiramidales, fenotiazinas, feocromocitomas y/o hemorragias gastrointestinales.

Precauciones:

Advertir a los pacientes conductores de vehículos y operadores de maquinarias de posible riesgo de somnolencia.

Advertencias:

Producto de uso delicado, administrar bajo vigilancia médica. Con el uso de este producto no ingiera bebidas alcohólicas.

Embarazo y lactancia: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. De ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este producto tiene efectos estimulante de la secreción de prolactina, sustancia que ha sido relacionada con aumento del riesgo de carcinoma mamario.

Reacciones adversas:

Neurológicas: Inquietud, debilidad, reacciones extrapiramidales, insomnio, cefalea, convulsiones. Gastrointestinales: náuseas, diarrea. Hormonales: Galactorrea, amenorrea reversible, ginecomastia. Otros: Hipertensión transitoria.

Interacciones:

Potencia los efectos extrapiramidales de la fenotiazina, butirofenona y tiroxantinas. Potenciación de su efecto cuando se asocia con otros depresores del sistema nervioso central: Opiáceos, barbitúricos, anestésicos, alcohol, otros analgésicos, sedantes hipnóticos y tranquilizantes. Puede alterar los requerimientos de insulina en insulina- dependientes. Disminuye la absorción de digoxina. Incrementa la absorción de acetaminofen, aspirina, diazepam, etanol, levodopa y litio.

Presentación:

- **Comprimidos de 10 mg :** Caja de 20 comprimidos E.F. 13.841
- **Ampollas(10mg/2mL):** Caja de 6 ampollas de 2 ml cada ampolla E.F. 13.842.
- **Solución Bebible (1mg/mL):** Frasco de 100ml. E.F. 13.840.
- **Gotas (2,6 mg/mL):** Frasco de 30mL con cuentagotas. (1mL = 20 gotas). E.F. 14.650